

La fonction logarithme népérien :

La fonction logarithme népérien notée \ln est l'unique fonction, définie et dérivable sur $]0, +\infty[$ [et Vérifiant $\ln 1 = 0$

et pour tout réel $x > 0$, $(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$

Il est continu et strictement croissant sur $]0, +\infty[$.

Premières propriétés (directement liées à la définition)

Pour tous réels : $\forall x > 0 ; \forall y > 0 ; \forall r \in \mathbb{Q}$

1) $\ln x = \ln y \Leftrightarrow x = y$ 2) $x \leq y \Leftrightarrow \ln x \leq \ln y$

3) $\ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1$ 4) $\ln x < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$

5) $\ln(x \times y) = \ln x + \ln y$ 6) $e \approx 2,71828\dots$ et $\ln(e) = 1$

7) $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x$ 8) $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$

9) $\ln\sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$ 10) $\ln(x^r) = r \ln x$

11) $\ln(e^x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$ 12) $(e^{\ln x} = x) \quad (\forall x > 0)$

13) $e^x = y \Leftrightarrow x = \ln y \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad \forall y > 0$

(Limites usuelles)

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ 2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^r} = 0$ (où $r \in \mathbb{Q}_*^+$)

5) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^r \ln x = 0$ (où $r \in \mathbb{Q}_*^+$)

6) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$

7) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$

Dérivée et primitives de la fonction $x \rightarrow \ln(u(x))$

1) Si u est une fonction dérivable sur I et ne s'annule pas sur I alors la fonction : $f(x) = \ln(|u(x)|)$ est dérivable sur I

et $(\forall x \in I) (f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)})$

2) Si u est une fonction dérivable sur I et ne s'annule pas sur

I alors les fonctions primitives de la fonction $x \rightarrow \frac{u'(x)}{u(x)}$ sont

les fonctions : $F(x) = \ln(|u(x)|) + Cte$

x

x

TD+CORRECTIONS-FONCTIONS LOGARITHMIQUES

Exercice1 : déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

1) $f : x \rightarrow \ln(x+1)$ 2) $g : x \rightarrow \ln(x^2 - 3x + 2)$

3) $h : x \rightarrow \frac{x}{\ln x}$ 4) $k : x \rightarrow \ln x + \ln(x-1)$

5) $m : x \rightarrow \ln\left(\frac{x-4}{x+1}\right)$

solution : 1) $f(x) = \ln(x+1)$

$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x+1 > 0\}$

$x+1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$ donc : $D_f =]-1, +\infty[$

2) $g(x) = \ln(x^2 - 3x + 2)$

$D_g = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 3x + 2 > 0\}$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 9 - 8 = 1 > 0$

$x_1 = \frac{3+1}{2 \times 1} = \frac{4}{2} = 2$ et $x_2 = \frac{3-1}{2 \times 1} = \frac{2}{2} = 1$

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
x^2-3x+2	$+$	0	$-$	0	$+$

Donc : $D_g =]-\infty, 1[\cup]2, +\infty[$

3) $h(x) = \frac{x}{\ln x}$ $D_h = \{x \in \mathbb{R} / x > 0 \text{ et } \ln x \neq 0\}$

$\ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = \ln 1 \Leftrightarrow x = 1$ donc : $D_h =]0; 1[\cup]1; +\infty[$

4) $k : x \rightarrow \ln x + \ln(x-1)$

La fonction est définie ssi $x > 0$ et $x-1 > 0$ cad

$x > 0$ et $x > 1$ donc : $D_k =]1; +\infty[$

5) $m : x \rightarrow \ln\left(\frac{x-4}{x+1}\right)$

La fonction est définie ssi $\frac{x-4}{x+1} > 0$ et $x+1 > 0$

En utilisant le tableau de signe on trouve :

$D_m =]-\infty, -1[\cup]4, +\infty[$

Exercice2 : Résoudre dans \mathbb{R} les équations

et inéquations suivantes : 1) $\ln(x-2) = 0$

2) $\ln(3x-1) = \ln(5x-10)$ 3) $\ln(2x-1) - \ln(1-x) = 0$

4) $\ln(2x) = \ln(x^2 + 1)$ 5) $\ln(2x-6) \geq 0$

6) $\ln(x-1) - \ln(3x+1) < 0$

Solution : 1) $\ln(x-2) = 0$

a) cette équation est définie ssi : $x-2 > 0$

$x-2 > 0 \Leftrightarrow x > 2$ donc : $D_E =]2; +\infty[$

b) Résoudre l'équation :

$\ln(x-2) = 0 \Leftrightarrow \ln(x-2) = \ln(1) \Leftrightarrow x-2 = 1 \Leftrightarrow x = 3 \Leftrightarrow x \in D_E$

Donc : $S = \{3\}$

2) $\ln(3x-1) = \ln(5x-10)$

a) cette équation est définie ssi : $5x-10 > 0$ et

$3x-1 > 0$ cad $x > 2$ et $x > \frac{1}{3}$ donc : $D_E =]2; +\infty[$

b) Résoudre l'équation :

$\ln(3x-1) = \ln(5x-10) \Leftrightarrow 3x-1 = 5x-10 \Leftrightarrow -2x = -9$

Donc : $\Leftrightarrow x = \frac{9}{2} \in D_E$ donc : $S = \left\{\frac{9}{2}\right\}$

3) $\ln(2x-1) - \ln(1-x) = 0$

a) cette équation est définie ssi : $2x-1 > 0$ et

$1-x > 0$ cad $x > \frac{1}{2}$ et $x < 1$

donc : $D_E = \left] \frac{1}{2}; 1 \right[$

b) Résoudre l'équation :

$$\ln(2x-1) - \ln(1-x) = 0 \Leftrightarrow \ln(2x-1) = \ln(1-x)$$

$$2x-1 = 1-x \Leftrightarrow 3x = 2 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3} \in D_E$$

Donc : $S = \left\{ \frac{2}{3} \right\}$

4) $\ln(2x) = \ln(x^2 + 1)$

a) cette équation est définie ssi : $2x > 0$ et

$$x^2 + 1 > 0 \text{ cad } x > 0 \text{ donc : } D_E =]0; +\infty[$$

b) $\ln(2x) = \ln(x^2 + 1) \Leftrightarrow 2x = x^2 + 1 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0$

$$\Leftrightarrow (x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \in D_E \text{ Donc : } S = \{1\}$$

5) $\ln(2x-6) \geq 0$

a) cette équation est définie ssi : $2x-6 > 0$

$$2x-6 > 0 \Leftrightarrow x > 3 \text{ Donc : } D_E =]3; +\infty[$$

b) Résoudre l'inéquation :

$$\ln(2x-6) \geq 0 \Leftrightarrow \ln(2x-6) \geq \ln 1 \Leftrightarrow 2x-6 \geq 1$$

$$\Leftrightarrow x \geq \frac{7}{2} \Leftrightarrow x \in \left[\frac{7}{2}; +\infty \right[$$

donc : $S = \left[\frac{7}{2}; +\infty \right[\cap]3; +\infty[= \left[\frac{7}{2}; +\infty \right[$

6) $\ln(x-1) - \ln(3x+1) < 0$

a) cette équation est définie ssi : $x-1 > 0$ et

$$3x+1 > 0 \text{ cad } \left(x > -\frac{1}{3}; x > 1 \right) \text{ donc } D_l =]1; +\infty[$$

b) Résoudre l'inéquation :

$$\ln(x-1) - \ln(3x+1) < 0 \Leftrightarrow \ln(x-1) < \ln(3x+1)$$

$$x-1 < 3x+1 \Leftrightarrow 2x > -2 \Leftrightarrow x > -1$$

Donc : $S =]-1; +\infty[\cap]1; +\infty[\text{ donc : } S =]1; +\infty[$

Exercice3 : On pose $\ln(2) \approx 0,7$ et $\ln(3) \approx 1,1$

Calculer: $\ln(6)$; $\ln(4)$; $\ln(8)$; $\ln(72)$

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) ; \ln\left(\frac{3}{2}\right) ; \ln(\sqrt{2}) ; \ln(\sqrt{6}) ; \ln(3\sqrt{2})$$

$$\ln(12\sqrt[3]{3}) ; A = \ln\sqrt{2+\sqrt{2}} + \ln\sqrt{2-\sqrt{2}} ;$$

$$B = \frac{1}{4}\ln 81 + \ln\sqrt{3} - \ln\frac{1}{27} \text{ et } C = \ln(\sqrt{2}+1)^{2015} + \ln(\sqrt{2}-1)^{2019}$$

Solution :

$$\ln(6) = \ln(2 \times 3) = \ln(2) + \ln(3) \approx 0,7 + 1,1 = 1,8$$

$$\ln(4) = \ln(2 \times 2) = \ln(2^2) = 2\ln(2) \approx 2 \times 0,7 = 1,4$$

$$\ln(8) = \ln(2 \times 2 \times 2) = \ln(2^3) = 3\ln(2) \approx 3 \times 0,7 = 2,1$$

$$\ln(72) = \ln(3^2 \times 2^3) = \ln(3^2) + \ln(2^3) = 2\ln(3) + 3\ln(2)$$

$$\ln(72) \approx 2 \times 1,1 + 3 \times 0,7 = 2,2 + 2,1 = 4,3$$

$$\ln\left(\frac{3}{2}\right) = \ln(3) - \ln(2) \approx 1,1 - 0,7 = 0,4$$

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2) \approx -0,7$$

$$\ln(\sqrt{6}) = \frac{1}{2}\ln(6) = \frac{1}{2} \times 1,8 = 0,9$$

$$\ln(3\sqrt{2}) = \ln(3) + \ln(\sqrt{2}) \approx 1,1 + \frac{1}{2}\ln(2) \approx 1,1 + \frac{0,7}{2} \approx 1,1 + 0,35 = 1,45$$

$$\ln(12\sqrt[3]{3}) = \ln(3 \times 2^2) + \ln(\sqrt[3]{3}) = \ln(3) + 2\ln(2) + \ln\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\ln(12\sqrt[3]{3}) = \ln(3) + 2\ln(2) + \frac{1}{3}\ln(3) \approx 1,1 + 1,4 + \frac{1}{3} \times 1,1 = 2,86$$

$$A = \ln\sqrt{2+\sqrt{2}} + \ln\sqrt{2-\sqrt{2}} = \ln\left(\left(\sqrt{2+\sqrt{2}}\right)\left(\sqrt{2-\sqrt{2}}\right)\right) = \ln\left(\sqrt{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}\right)$$

$$A = \ln\left(\sqrt{2^2 - (\sqrt{2})^2}\right) = \ln\sqrt{2} = \frac{1}{2}\ln 2 \approx 0,35$$

$$B = \frac{1}{4}\ln 81 + \ln\sqrt{3} - \ln\frac{1}{27} = \frac{1}{4}\ln 3^4 + \frac{1}{2}\ln 3 - \ln\frac{1}{3^3} = \frac{4}{4}\ln 3 + \frac{1}{2}\ln 3 + 3\ln 3$$

$$B \approx 1,1 + \frac{1,1}{2} + 3 \times 1,1 = 4,95$$

$$C = \ln(\sqrt{2}+1)^{2015} + \ln(\sqrt{2}-1)^{2019} = \ln\left(\left(\sqrt{2}+1\right)^{2015} \times \left(\sqrt{2}-1\right)^{2019}\right)$$

$$C = \ln\left(\left(\sqrt{2}+1\right)\left(\sqrt{2}-1\right)\right)^{2019} = \ln\left(\left(\sqrt{2}\right)^2 - 1^2\right)^{2019} = 2019\ln(1) = 2019 \times 0 = 0$$

Exercice4 : On pose $\alpha = \ln(a)$ et $\beta = \ln(b)$

Calculer en fonction de α et β les réels suivants :

$$\ln(a^2b^5) \text{ et } \frac{1}{\sqrt[6]{a^7b}}$$

Solution :

$$\ln(a^2 b^5) = \ln(a^2) + \ln(b^5) = 2\ln a + 5\ln b = 2\alpha + 5\beta$$

$$\ln\left(\frac{1}{\sqrt[6]{a^7 b}}\right) = \ln\left(a^{-\frac{7}{6}} b^{-\frac{1}{6}}\right) = \ln a^{-\frac{7}{6}} + \ln b^{-\frac{1}{6}} = -\frac{7}{6}\ln a - \frac{1}{6}\ln b$$

$$\ln\left(\frac{1}{\sqrt[6]{a^7 b}}\right) = -\frac{7}{6}\alpha - \frac{1}{6}\beta$$

Exercice5 : simplifier et calculer :

$$A = \ln(e^2) + \ln(e^4) - \ln\left(\frac{1}{e}\right)$$

$$B = 2\ln(\sqrt{e}) + \ln(e\sqrt{e}) - \frac{1}{3}\ln(e^9)$$

Solution :

$$A = \ln(e^2) + \ln(e^4) - \ln\left(\frac{1}{e}\right) = 2\ln(e) + 4\ln(e) - (-\ln(e))$$

$$A = 2 \times 1 + 4 \times 1 - (-1) = 7$$

$$B = 2\ln(\sqrt{e}) + \ln(e\sqrt{e}) - \frac{1}{3}\ln(e^9) = 2 \times \frac{1}{2}\ln(e) + \ln e + \ln(\sqrt{e}) - \frac{1}{3} \times 9\ln(e)$$

$$B = 1\ln(e) + \ln e + \frac{1}{2}\ln(e) - 3\ln(e) = 1 + 1 + \frac{1}{2} - 3 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

Exercice6 : Résoudre dans \mathbb{R} les équations et inéquations suivantes :

$$1) \ln(2x-1) = \frac{3}{2} \quad 2) 2(\ln x)^2 + \ln x - 6 = 0$$

$$3) 3(\ln x)^2 + 2\ln x - 1 = 0 \quad 4) \frac{\ln x + 3}{\ln x - 1} \geq -1$$

$$5) \ln x + \ln(x-1) - \ln 2 = \ln 3$$

$$6) \ln(2x+5) + \ln(x+1) \leq \ln 4$$

$$7) \ln(14-x) > \ln(10+7x-3x^2)$$

Solution : 1) $\ln(2x-1) = \frac{3}{2}$

a) cette équation est définie ssi :

$$2x-1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{2} \quad \text{donc : } D_E = \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$$

b) Résoudre l'équation :

$$\ln(2x-1) = \frac{3}{2} \Leftrightarrow \ln(2x-1) = \frac{3}{2}\ln(e)$$

$$\Leftrightarrow \ln(2x-1) = \ln\left(e^{\frac{3}{2}}\right) \Leftrightarrow 2x-1 = e^{\frac{3}{2}}$$

$$\Leftrightarrow 2x-1 = (\sqrt{e})^3 \Leftrightarrow x = \frac{(\sqrt{e})^3 + 1}{2} \in \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$$

$$\text{Donc : } S = \left\{ \frac{(\sqrt{e})^3 + 1}{2} \right\}$$

$$2) 2(\ln x)^2 + \ln x - 6 = 0$$

a) cette équation est définie ssi : $x > 0$

b) on pose : $\ln x = X$

$$\text{on a alors : } 2X^2 + X - 6 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1 + 48 = 49 > 0$$

$$X_1 = \frac{-1+7}{2 \times 2} \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{-1-7}{2 \times 2}$$

$$\text{Donc : } X_1 = \frac{3}{2} \quad \text{et} \quad X_2 = -2$$

$$\text{Donc : } \ln x_1 = \frac{3}{2} \quad \text{et} \quad \ln x_2 = -2$$

$$\text{Donc : } x_1 = e^{\frac{3}{2}} \quad \text{et} \quad x_2 = e^{-2} \quad \text{finalement :}$$

$$S = \left\{ e\sqrt{e}, \frac{1}{e^2} \right\}$$

$$3) 3(\ln x)^2 + 2\ln x - 1 = 0$$

a) cette équation est définie ssi : $x > 0$

on pose : $\ln x = X$

$$\text{on a alors : } 3X^2 + 2X - 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4 + 12 = 16 > 0$$

$$X_1 = \frac{-2+4}{2 \times 3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{-2-4}{2 \times 3} = \frac{-6}{6} = -1$$

$$\text{Donc : } \ln x_1 = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad \ln x_2 = -1$$

$$\text{Donc : } x_1 = e^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{e} \quad \text{et} \quad x_2 = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$\text{finalement : } S = \left\{ \sqrt[3]{e}, \frac{1}{e} \right\}$$

$$4) \frac{\ln x + 3}{\ln x - 1} \geq -1$$

a) cette équation est définie ssi : $x > 0$ et $\ln x - 1 \neq 0$

$$\ln x - 1 = 0 \Leftrightarrow \ln x = 1 \Leftrightarrow \ln x = \ln e \Leftrightarrow x = e$$

donc $D_f =]0; e[\cup]e; +\infty[$

b) $\frac{\ln x + 3}{\ln x - 1} \geq -1 \Leftrightarrow \frac{\ln x + 3}{\ln x - 1} + 1 \geq 0 \Leftrightarrow 2 \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} \geq 0$

$\ln x + 1 = 0 \Leftrightarrow \ln x = -1 \Leftrightarrow \ln x = \ln \frac{1}{e} \Leftrightarrow x = \frac{1}{e}$

$\ln x - 1 = 0 \Leftrightarrow \ln x = 1 \Leftrightarrow \ln x = \ln e \Leftrightarrow x = e$

x	0	$\frac{1}{e}$	e	$+\infty$
$\ln x + 1$	-	0	+	+
$\ln x - 1$	-	-	0	+
$\frac{\ln x + 1}{\ln x - 1}$	+	0	-	+

$S = (]0; e[\cup]e; +\infty[) \cap \left(\left] 0; \frac{1}{e} \right] \cup]e; +\infty[\right) = \left] 0; \frac{1}{e} \right] \cup]e; +\infty[$

5) $\ln x + \ln(x-1) - \ln 2 = \ln 3$

a) cette équation est définie ssi : $x > 0$ et $x-1 > 0$

donc : $D_E =]1; +\infty[$

b) $\ln x + \ln(x-1) - \ln 2 = \ln 3$

$\Leftrightarrow \ln x + \ln(x-1) = \ln 2 + \ln 3 \Leftrightarrow \ln(x(x-1)) = \ln 6$

Ssi $x(x-1) = 6$ ssi $x^2 - x - 6 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25 > 0$

$x_1 = \frac{-(-1) + \sqrt{25}}{2 \times 1}$ et $x_2 = \frac{-(-1) - \sqrt{25}}{2 \times 1}$

$x_1 = 3$ ou $x_2 = -2 \notin]1; +\infty[$ donc : $S = \{3\}$

6) $\ln(2x-5) + \ln(x+1) \leq \ln 4$

a) cette équation est définie ssi : $x+1 > 0$ et

$2x-5 > 0$ cad $\left(x > \frac{5}{2} \text{ et } x > -1 \right)$ donc $D_f = \left] \frac{5}{2}; +\infty[\right[$

b)

$\ln(2x-5) + \ln(x+1) \leq \ln 4 \Leftrightarrow \ln((2x-5)(x+1)) \leq \ln 4$

$(2x-5)(x+1) \leq 4 \Leftrightarrow 2x^2 - 3x - 9 \leq 0$

$\Delta = b^2 - 4ac = 9 - 4 \times 2 \times (-9) = 9 + 72 = 81 > 0$

$x_1 = \frac{3+9}{2 \times 2}$ et $x_2 = \frac{3-9}{2 \times 2}$ donc : $x_1 = 3$ et $x_2 = -\frac{3}{2}$

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	3	$+\infty$	
$2x^2 - 3x - 9$	+	0	-	0	+

Donc : $S = \left[-\frac{3}{2}; 3 \right] \cap \left] \frac{5}{2}; +\infty[\right[= \left] \frac{5}{2}; 3 \right[$

7) $\ln(14-x) > \ln(10+7x-3x^2)$

a) cette équation est définie ssi : $14-x > 0$ et

$10+7x-3x^2 > 0$ après résolution on trouve :

$D_f = \left] -1; \frac{10}{3} \right[$

b) $\ln(14-x) > \ln(10+7x-3x^2)$

$14-x > 10+7x-3x^2 \Leftrightarrow 3x^2 - 8x + 4 > 0$

$\Leftrightarrow (x-2)(3x-2) > 0 \Leftrightarrow x \in \left] -\infty; \frac{2}{3} \right[\cup]2; +\infty[$

Donc : $S = \left(\left] -\infty; \frac{2}{3} \right[\cup]2; +\infty[\right) \cap \left] -1; \frac{10}{3} \right[$

$S = \left] -1; \frac{2}{3} \right[\cup \left] 2; \frac{10}{3} \right[$

Exercice 7 : Résoudre dans \mathbb{R}^2 le système

suivant : $\begin{cases} 3 \ln x + \ln y = 2 \\ 2 \ln x - \ln y = 3 \end{cases}$

Solution : $\begin{cases} 3 \ln x + \ln y = 2 \rightarrow 1 \\ 2 \ln x - \ln y = 3 \rightarrow 2 \end{cases} \quad x > 0 \text{ et } y > 0$

La somme des deux équations membres à membres donne :

$5 \ln x = 5 \Leftrightarrow \ln x = 1 \Leftrightarrow \ln x = \ln e \Leftrightarrow x = e$

On remplace $x = e$ dans la première équation
On a donc :

$3 \ln e + \ln y = 2 \Leftrightarrow \ln y = 2 - 3 \Leftrightarrow \ln y = -1$

$\Leftrightarrow y = e^{-1} \Leftrightarrow y = \frac{1}{e}$ Donc $S = \left\{ \left(e; \frac{1}{e} \right) \right\}$

Exercice8 : déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

1) $f : x \rightarrow \frac{\ln(x+1)}{\ln(\ln x)}$ 2) $g : x \rightarrow \sqrt{1 - \ln(e-x)}$

3) $h : x \rightarrow \frac{x}{\sqrt{(\ln(2x))^2 - 1}}$

Solution : 1) cette fonction est définie ssi :

$x+1 > 0$ et $x > 0$ et $\ln x > 0$ et $\ln(\ln x) \neq 0$
 Cad $x > -1$ et $x > 0$ et $x > 1$ et $\ln x \neq 1$
 Cad $x > 1$ et $x \neq e$ donc : $D_f =]1; e[\cup]e; +\infty[$

2) cette fonction est définie ssi :

$e - x > 0$ et $1 \geq \ln(e-x)$
 Cad $x < e$ et $e - x \leq e$ Cad $x < e$ et $x \geq 0$
 donc : $D_g = [0; e[$

3) $h : x \rightarrow \frac{x}{\sqrt{(\ln(2x))^2 - 1}}$

Cette fonction est définie ssi :

$2x > 0$ et $(\ln(2x))^2 - 1 > 0$
 Cad $x > 0$ et $(\ln(2x) - 1)(\ln(2x) + 1) > 0$
 $\ln(2x) + 1 = 0 \Leftrightarrow \ln 2x = -1 \Leftrightarrow \ln 2x = \ln \frac{1}{e} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2e}$

$\ln(2x) - 1 = 0 \Leftrightarrow \ln 2x = 1 \Leftrightarrow \ln 2x = \ln e \Leftrightarrow x = \frac{e}{2}$

x	0	$\frac{1}{2e}$	$\frac{e}{2}$	$+\infty$
$\ln 2x + 1$	-	0	+	+
$\ln 2x - 1$	-	-	0	+
$(\ln 2x + 1)(\ln 2x - 1)$	+	0	-	+

$S =]0; \frac{1}{2e}[\cup]\frac{e}{2}; +\infty[$

Exercice9 : Déterminer les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln(x) + 1}{\ln x}$ 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln^2(x) - \ln x)$

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \ln x$ 4) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln^2(x) + \ln x$

5) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} + \ln x \right)$

6) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^4 \log x$

7) $\lim_{x \rightarrow 0^+} 2x - x^3 \ln x$ 8) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$

9) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x (\ln(x))^2$ on pose : $X = \sqrt{x}$

10) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 3x)}{x - 1}$ 11) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 (\ln x)^5$

Solution : 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln(x) + 1}{\ln x}$?

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \ln(x) + 1 = 2 \times (+\infty) + 1 = +\infty$

Et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ donc forme indéterminé (FI)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln x + 1}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x \left(2 + \frac{1}{\ln x} \right)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 + \frac{1}{\ln x} = 2 + 0 = 2$
 (car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$)

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln^2(x) - \ln x)$?

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln^2(x) - \ln x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln^2(x) - \ln x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x (\ln(x) - 1) = +\infty$
 (car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$)

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \ln x$?

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \ln x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = +\infty$

(car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$)

4) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln^2(x) + \ln x$?

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln^2(x) + \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x (\ln(x) + 1) = -\infty$

Car $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) + 1 = -\infty$

5) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} + \ln x \right)$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} + \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + x \ln x}{x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$ car $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$

6) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^4 \log x = 0$ car $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0$ (où $n \in \mathbb{N}^*$)

$$7) \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x - x^3 \ln x = 0$$

$$8) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \text{ on pose : } X = \sqrt{x}$$

$$x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow X \rightarrow 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{X} \ln(1+X) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+X)}{X} = 1$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$9) \lim_{x \rightarrow 0^+} x (\ln(x))^2 \text{ on pose : } X = \sqrt{x}$$

$$X = \sqrt{x} \Leftrightarrow X^2 = (\sqrt{x})^2 \Leftrightarrow X^2 = x$$

$$x \rightarrow 0^+ \Leftrightarrow X \rightarrow 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x (\ln(x))^2 = \lim_{x \rightarrow 0^+} X^2 (\ln(X^2))^2 = \lim_{x \rightarrow 0^+} X^2 (2 \ln X)^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x (\ln(x))^2 = \lim_{x \rightarrow 0^+} 4X^2 (\ln X)^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x (\ln(x))^2 = 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} (X \ln X)^2 = 4 \times 0^2 = 0$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0^-$$

$$10) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 3x)}{x-1} ? \text{ On pose : } f(x) = \frac{\ln(x^2 + 3x)}{x-1}$$

$$f(x) = \frac{\ln \left(x^2 \left(1 + \frac{3}{x} \right) \right)}{x-1} = \frac{\ln x^2 + \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right)}{x-1}$$

$$f(x) = \frac{2 \ln x + \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right)}{x-1} = \frac{2 \ln x}{x-1} + \frac{\ln \left(1 + \frac{3}{x} \right)}{x-1}$$

$$f(x) = 2 \frac{\ln x}{1 - \frac{1}{x}} + \frac{\ln \left(1 + \frac{3}{x} \right)}{x-1} \text{ on a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ et}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) = 0$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 3x)}{x-1} = 0$$

$$11) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 (\ln x)^5 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{2}{5}} \ln x \right)^5$$

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{2}{5}} \ln x = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 (\ln x)^5 = 0$$

Exercice10 : Déterminer le domaine de dérivation et la dérivée de la fonction suivante :

$$f(x) = \ln(3x^2 + 5)$$

Solution : la fonction $u : x \rightarrow 3x^2 + 5$ est dérivable

sur \mathbb{R} et on a : $3x^2 + 5 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

alors la fonction : $f : x \rightarrow \ln(3x^2 + 5)$ est dérivable

$$\text{sur } \mathbb{R} \text{ et on a : } f'(x) = \frac{(3x^2 + 5)'}{3x^2 + 5} = \frac{6x}{3x^2 + 5} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Exercice11 : calculer la dérivée des fonctions

définies par : 1) $f(x) = x^2 - \ln x$ 2) $f(x) = x \ln x$

$$3) f(x) = \ln(1+x^2)$$

$$\text{Solution : 1) } f'(x) = (x^2 - \ln x)' = 2x - \frac{1}{x} = \frac{2x^2 - 1}{x}$$

$$2) f'(x) = (x \ln x)' = x' \ln x + x \ln' x = 1 \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

$$3) f'(x) = (\ln(1+x^2))' = \frac{(1+x^2)'}{1+x^2} = \frac{2x}{1+x^2}$$

Exercice12 : calculer la dérivée de la fonction

définie sur $I =]-2; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{\sqrt[4]{x^3 + 8}}{(x^2 + 1)^3}$

Solution : $\forall x \in]-2; +\infty[$ on a :

$$\ln(f(x)) = \ln \left(\frac{\sqrt[4]{x^3 + 8}}{(x^2 + 1)^3} \right) = \ln(\sqrt[4]{x^3 + 8}) - \ln(x^2 + 1)^3$$

$$\ln(f(x)) = \frac{1}{4} \ln(x^3 + 8) - 3 \ln(x^2 + 1)$$

$$\text{Donc : } \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{4} \frac{(x^3 + 8)'}{x^3 + 8} - 3 \frac{(x^2 + 1)'}{x^2 + 1} \quad \forall x \in]-2; +\infty[$$

$$\text{Donc : } \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{4} \frac{3x^2}{x^3 + 8} - 3 \frac{2x}{x^2 + 1}$$

$$\text{Donc : } \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{-3x(7x^3 - x + 64)}{4(x^3 + 8)(x^2 + 1)}$$

Donc :

$$f'(x) = \frac{-3x(7x^3 - x + 64)}{4(x^3 + 8)(x^2 + 1)} f(x) = \frac{-3x(7x^3 - x + 64)}{4\sqrt{(x^3 + 8)^3 (x^2 + 1)^4}}$$

Exercice13 : Déterminer le domaine de dérivation et la dérivée des fonctions suivantes :

1) $f(x) = \ln|\ln|x||$

2) $f(x) = \ln|\sin^2 x + 3\sin x + 4|$

Solution : 1) cette fonction est définie ssi :

$$|x| > 0 \text{ et } \ln|x| > 0 \text{ cad } x \neq 0 \text{ et } |x| > 1$$

Donc : $D_f =]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$

Donc f est dérivable sur $]-\infty; -1[$ et $]1; +\infty[$

$$\forall x \in]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[: f'(x) = (\ln|\ln|x||)' = \frac{(\ln|x|)'}{\ln|x|}$$

$$f'(x) = (\ln|\ln|x||)' = \frac{1}{x \ln|x|}$$

2) $f(x) = \ln|\sin^2 x + 3\sin x + 4|$

cette fonction est définie ssi : $\sin^2 x + 3\sin x + 4 > 0$

on pose : $t = \sin x$ donc : $t^2 + 3t + 4$

$\Delta = 9 - 16 = -7 < 0$ donc : $t^2 + 3t + 4 > 0$

Donc : $D_f = \mathbb{R}$

Alors : la fonction f est dérivable sur \mathbb{R}

$$f'(x) = \frac{(\sin^2 x + 3\sin x + 4)'}{\sin^2 x + 3\sin x + 4} = \frac{2\sin x \cos x + 3\cos x}{\sin^2 x + 3\sin x + 4}$$

Exercice14 : Déterminer les fonctions primitives des fonctions suivantes :

1) $I = \mathbb{R}; f(x) = \frac{x^3}{x^4 + 2}$ 2) $I =]0; 1[; g(x) = \frac{1}{x \ln x}$

3) $I =]-\infty; 1[; h(x) = \frac{1}{x-1}$ 4) $I = \left] \frac{3\pi}{2}; 2\pi \right[; k(x) = \frac{\cos x}{\sin x}$

5) $M(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$ (Essayer d'écrire

$g(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1}$ où a et b des réels à déterminer).

6) $N(x) = \frac{x^3 + 2x^2 - 3x + 2}{x-3}$

7) $I =]3; +\infty[; q(x) = \frac{1}{(x-2)\ln(x-2)}$

Solution : 1) on a $f(x) = \frac{x^3}{x^4 + 2} = \frac{1}{4} \frac{(x^4 + 2)'}{x^4 + 2}$

Donc : $F(x) = \frac{1}{4} \ln|x^4 + 2| + k$ avec $k \in \mathbb{R}$

Puisque : $x^4 + 2 > 0$ donc : $F(x) = \frac{1}{4} \ln(x^4 + 2) + k$

2) $f(x) = \frac{1}{x \ln x} = \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} = \frac{(\ln x)'}{\ln x}$

donc les fonctions primitives sont :

$G(x) = \ln|\ln x| + k$ avec $k \in \mathbb{R}$

Puisque : $x \in]0; 1[$ donc : $\ln x < 0$

Donc : $F(x) = \ln(-\ln x) + k$ avec $k \in \mathbb{R}$

3) $I =]-\infty; 1[; h(x) = \frac{1}{x-1} = \frac{(x-1)'}{x-1}$ donc les fonctions

primitives sont : $H(x) = \ln|x-1| + k$

Puisque : $x \in]-\infty; 1[$ donc : $x-1 < 0$

Donc : $H(x) = \ln(1-x) + k$ avec $k \in \mathbb{R}$

4) $I = \left] \frac{3\pi}{2}; 2\pi \right[; k(x) = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{(\sin x)'}{\sin x}$ donc les

fonctions primitives sont : $K(x) = \ln|\sin x| + k$

avec $k \in \mathbb{R}$

5) $m(x) = \frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{(x+1)(x-1)} = \frac{1}{2} \frac{(x+1) - (x-1)}{(x+1)(x-1)}$

$$m(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{(x+1)}{(x+1)(x-1)} - \frac{(x-1)}{(x+1)(x-1)} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$$

Donc les fonctions primitives sont :

$$M(x) = \frac{1}{2} (\ln|x-1| - \ln|x+1|) = \frac{1}{2} \left(\ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \right) = \ln \sqrt{\left| \frac{x-1}{x+1} \right|} + k$$

$$6) n(x) = \frac{x^3 + 2x^2 - 3x + 2}{x-3} = \frac{(x-3)(x^2 + 5x + 12) + 38}{x-3}$$

$$\text{Donc : } n(x) = x^2 + 5x + 12 + \frac{38}{x-3}$$

Donc les fonctions primitives sont :

$$N(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{5}{2}x^2 + 12x + 38 \ln|x-3| + k \quad \text{avec } k \in \mathbb{R}$$

$$7) I =]3; +\infty[; q(x) = \frac{1}{(x-2)\ln(x-2)}$$

$$q(x) = \frac{1}{(x-2)\ln(x-2)} = \frac{\frac{1}{(x-2)}}{\ln(x-2)} = \frac{(\ln(x-2))'}{\ln(x-2)}$$

Donc : donc les fonctions primitives sont :

$$Q(x) = \ln|\ln(x-2)| + k \quad \text{avec } k \in \mathbb{R}$$

Exercice 15 : Considérons la fonction f définie

$$\text{par : } f(x) = \frac{5x+1}{x^2+x-2}$$

1) Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f et Déterminer les réels a et b tels que :

$$(\forall x \in D); f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+2}$$

2) En déduire la fonction primitive de f sur

$$]-\infty; -2[\quad \text{Tel que } F(-3) = \ln 2$$

$$\text{Solution :1) } D_f = \{x \in \mathbb{R} / x^2 + x - 2 \neq 0\}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times (-2) \times 1 = 1 + 8 = 9 > 0$$

$$x_1 = \frac{-1+3}{2 \times 1} = \frac{2}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-1-3}{2 \times 1} = \frac{-4}{2} = -2$$

$$\text{Donc : } D_f = \mathbb{R} / \{-2; 1\}$$

$$f(x) = \frac{a(x+2)+b(x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{ax+2a+bx-b}{(x-1)(x+2)} = \frac{(a+b)x+2a-b}{(x-1)(x+2)}$$

$$\text{Donc : } \begin{cases} a+b=5 \\ 2a-b=1 \end{cases} \quad \text{Donc: } 3a=6 \quad \text{Donc: } a=2$$

$$\text{Donc : } b=3 \quad \text{Donc: } (\forall x \in D_f); f(x) = \frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+2}$$

$$2) (\forall x \in \mathbb{R} / \{-2; 1\}); f(x) = 2 \frac{(x-1)'}{x-1} + 3 \frac{(x+2)'}{x+2}$$

$$F(x) = 2 \ln|x-1| + 3 \ln|x+2| + k \quad k \in \mathbb{R}$$

$$x \in]-\infty; -2[\Leftrightarrow x < -2 \quad \text{et} \quad x < 1$$

$$\text{Donc : } x+2 < 0 \quad \text{et} \quad x-1 < 0$$

Donc : les fonctions primitives sont :

$$F(x) = 2 \ln(1-x) + 3 \ln(-x-2) + k \quad k \in \mathbb{R}$$

$$F(-3) = \ln 2 \Leftrightarrow 2 \ln(4) + 3 \ln(1) + k = \ln 2$$

$$k = \ln 2 - 2 \ln(2^2) \Leftrightarrow k = -3 \ln 2$$

$$\text{Donc : } F(x) = 2 \ln(1-x) + 3 \ln(-x-2) - 3 \ln 2$$

Exercice 16 : simplifier et calculer :

$$1) \log_8 4 \quad 2) \log_{\sqrt{2}} \frac{1}{2} \quad 3) \log_{\sqrt{3}} 9$$

$$4) A = \log_2 \left(\frac{1}{5} \right) + \log_2(10) + \log_{\frac{1}{3}}(\sqrt[5]{3})$$

Solution :1)

$$\log_{\sqrt{2}} \frac{1}{2} = -\log_{\sqrt{2}} 2 = -\log_{\sqrt{2}} (\sqrt{2})^2 = -2 \log_{\sqrt{2}} \sqrt{2} = -2 \times 1 = -2$$

$$\log_{\sqrt{3}} 9 = \log_{\sqrt{3}} (\sqrt{3})^4 = 4 \log_{\sqrt{3}} \sqrt{3} = 4 \times 1 = 4$$

$$A = \log_2 \left(\frac{1}{5} \right) + \log_2(10) + \log_{\frac{1}{3}}(\sqrt[5]{3}) = -\log_2 5 + \log_2(5 \times 2) + \log_{\frac{1}{3}} \left(3^{\frac{1}{5}} \right)$$

$$A = -\log_2 5 + \log_2 5 + \log_2 2 + \frac{1}{5} \log_{\frac{1}{3}} 3 = 1 + \frac{1}{5} \log_{\frac{1}{3}} 3$$

$$A = 1 - \frac{1}{5} \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{3} = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

Exercice 17 : On pose $\alpha = \log_{40}(100)$ et

$$\beta = \log_{16}(25) \quad \text{Calculer } \beta \text{ en fonction } \alpha$$

Solution : on a : $\alpha = \frac{\ln 100}{\ln 40} = \frac{\ln(2^2 \times 5^2)}{\ln(2^3 \times 5)} = \frac{2\ln 2 + 2\ln 5}{3\ln 2 + \ln 5}$

D'autre part : $\beta = \frac{\ln 25}{\ln 16} = \frac{\ln(5^2)}{\ln(2^4)} = \frac{2\ln 5}{4\ln 2} = \frac{\ln 5}{2\ln 2}$

Aussi on a : $\alpha = \frac{2 + 2 \frac{\ln 5}{\ln 2}}{3 + \frac{\ln 5}{\ln 2}} = \frac{2 + 4\beta}{3 + 2\beta}$

$\alpha = \frac{2 + 4\beta}{3 + 2\beta} \Leftrightarrow \alpha(3 + 2\beta) = 2 + 4\beta \Leftrightarrow 3\alpha + 2\alpha\beta = 2 + 4\beta$

$3\alpha + 2\alpha\beta = 2 + 4\beta \Leftrightarrow 2(\alpha - 2)\beta = 2 - 3\alpha \Leftrightarrow \beta = \frac{2 - 3\alpha}{2(\alpha - 2)}$

Exercice 18 : simplifier et calculer :

1) $\log_{10} 100$ 2) $\log_{10} 0,0001$

3) $A = \log(250000) + \log \sqrt{250} - \log(125)$

Solution : 1) $\log_{10} 100 = \log_{10} 10^2 = 2\log_{10} 10 = 2 \times 1 = 2$

2) $\log_{10} 0,0001 = \log_{10} 10^{-4} = -4\log_{10} 10 = -4$

3) $A = \log(250000) + \log \sqrt{250} - \log(125)$

$A = \log(250000) + \log \sqrt{250} - \log(125)$

$A = \log(5^2 \times 10^4) + \frac{1}{2} \log(5^2 \times 10) - \log(5^3)$

$A = \log 5^2 + \log 10^4 + \frac{1}{2}(\log 5^2 + \log 10) - 3\log 5$

$A = 2\log 5 + 4\log 10 + \frac{1}{2}(2\log 5 + 1) - 3\log 5$

$A = 2\log 5 + 4 + \log 5 + \frac{1}{2} - 3\log 5 = 4 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$

Exercice 19 : déterminer le plus petit entier

naturel n tel que : $\left(\frac{3}{2}\right)^n \geq 10^{20}$

Solution : $\left(\frac{3}{2}\right)^n \geq 10^{20} \Leftrightarrow \log\left(\left(\frac{3}{2}\right)^n\right) \geq \log(10^{20})$

$\Leftrightarrow n \log\left(\frac{3}{2}\right) \geq 20 \Leftrightarrow n \geq \frac{20}{\log\left(\frac{3}{2}\right)}$

Le plus petit entier naturel n_0 est donc :

$$n_0 = E\left(\frac{20}{\log\left(\frac{3}{2}\right)}\right) + 1 = 114$$

Exercice 20 : 1) Résoudre dans \mathbb{R} l'équation :

1) $\log_3(2x) \times (\log_5(x) - 1) = 0$

2) $2(\log x)^2 - 19\log x - 10 = 0$

3) $\log_{\frac{1}{2}}\left(x - \frac{1}{2}\right) \geq 1$

4) $\log_{2x}(4x) + \log_{4x}(16x) = 4$

Où log est le logarithme décimal

Solution : 1) a) cette équation est définie ssi :

$x > 0$ et $2x > 0$ donc : $D_E =]0; +\infty[$

b) Résoudre l'équation : $\log_3(2x) \times (\log_5(x) - 1) = 0$

ssi $\log_5(x) - 1 = 0$ et $\log_3(2x) = 0$

ssi $\log_5(x) = \log_5(5)$ et $\log_3(2x) = \log_3(1)$

ssi $x = 5$ et $x = \frac{1}{2}$ donc : $S = \left\{\frac{1}{2}; 5\right\}$

2) $2(\log x)^2 - 19\log x - 10 = 0$

$D_E =]0; +\infty[$ on pose : $\log x = X$ donc :

$2X^2 - 19X - 10 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac = (19)^2 - 4 \times 2 \times (-10) = 361 + 80 = 441 = (21)^2 > 0$

$X_1 = \frac{19 + 21}{2 \times 2} = 10$ et $X_2 = \frac{19 - 21}{2 \times 2} = -\frac{1}{2}$

Donc : $\log x_1 = 10$ et $\log x_2 = -\frac{1}{2}$

Donc : $x_1 = 10^{10}$ et $x_2 = 10^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{10^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$

Donc : $S = \left\{\frac{\sqrt{10}}{10}, 10^{10}\right\}$

: 3) a) cette équation est définie ssi :

$$x - \frac{1}{2} > 0 \text{ donc : } x > \frac{1}{2} \text{ donc : } D_I = \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$$

$$a) \log_{\frac{1}{2}} \left(x - \frac{1}{2} \right) \geq 1 \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}} \left(x - \frac{1}{2} \right) \geq \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} \right) \Leftrightarrow x - \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$$

car : $\log_{\frac{1}{2}}$ est strictement décroissante

$$\text{donc : } x \leq 1 \text{ donc : } S =]-\infty; 1] \cap \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[= \left] \frac{1}{2}; 1 \right]$$

4)a) cette équation est définie ssi :

$$4x > 0 \text{ et } 16x > 0 \text{ et } 2x > 0 \text{ et } 2x \neq 1 \text{ et } 4x \neq 1$$

$$\text{donc : } x > 0 \text{ et } x \neq \frac{1}{2} \text{ et } x \neq \frac{1}{4}$$

$$\text{donc : } D_I =]0; +\infty[- \left\{ \frac{1}{4}; \frac{1}{2} \right\}$$

$$b) \forall x \in D_I : \log_{2x}(4x) + \log_{4x}(16x) = 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \log_{2x}(2) + \log_{2x}(2x) + \log_{4x}(4x) + \log_{4x}(4) = 4$$

Or on a $\log_a(a) = 1$ donc :

$$\Leftrightarrow \log_{2x}(2) + \log_{4x}(4) = 2$$

$$\text{Et on a : } \log_{2x}(2) = \frac{\ln(2)}{\ln(2x)} = \frac{1}{\log_2(2x)}$$

$$\log_2(2x) = \log_2(2) + \log_2 x = 1 + \log_2 x$$

$$\text{Donc : } \log_{2x}(2) = \frac{1}{1 + \log_2 x}$$

$$\text{D'autre part on a : } \log_{4x}(4) = \frac{\ln(4)}{\ln(4x)} = \frac{1}{\log_4(4x)} \text{ et}$$

$$\log_4(4x) = \log_4(4) + \log_4 x = 1 + \log_4 x$$

$$\text{Et puisque : } \log_4 x = \frac{\ln(x)}{\ln(4)} = \frac{\ln(x)}{2\ln(2)} = \frac{1}{2} \log_2 x$$

$$\text{Donc : } \log_{4x}(4) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \log_2(x)} = \frac{2}{2 + \log_2(x)}$$

$$\text{Donc l'équation devient : } \frac{1}{1 + \log_2 x} + \frac{2}{2 + \log_2 x} = 2$$

$$\text{Cad : } 2(\log_2 x)^2 + 3\log_2 x = 0$$

$$\text{Cad : } \log_2 x = \frac{-3}{2} \text{ ou } \log_2 x = 0$$

$$\text{Cad : } x = 2^{\frac{-3}{2}} = \frac{2}{2^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{\sqrt{2^3}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \text{ ou } x = 1$$

$$\text{donc : } S = \left\{ \frac{1}{2\sqrt{2}}; 1 \right\}$$

Exercice 21 : 1) Résoudre dans \mathbb{R} les inéquations et équations suivantes :

$$1) \log_3(7x-1)^2 = 0 \quad 2) \log_3(5x+1) = 2$$

$$3) \frac{\log_3(5x+1)}{\log_3(7x-1)^2} \leq 1$$

Solution : 1)a) cette équation est définie ssi :

$$7x-1 \neq 0 \text{ donc : } x \neq \frac{1}{7} \text{ donc : } D_I = \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{7} \right\}$$

$$\text{"b) } \log_3(7x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow (7x-1)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow 7x-1=1 \text{ ou } 7x-1=-1 \Leftrightarrow x = \frac{2}{7} \text{ ou } x = 0$$

$$\text{donc : } S = \left\{ 0; \frac{2}{7} \right\}$$

$$2) \log_3(5x+1) = 2$$

2)a) cette équation est définie ssi : $5x+1 > 0$

$$\text{Donc : } D_E = \left] -\frac{1}{5}; +\infty \right[$$

$$\log_3(5x+1) = 2 \Leftrightarrow 5x+1 = 3^2 \Leftrightarrow 5x = 8 \Leftrightarrow x = \frac{8}{5}$$

$$\text{Puisque : } \frac{8}{5} \in \left] -\frac{1}{5}; +\infty \right[\text{ alors : } S = \left\{ \frac{8}{5} \right\}$$

$$3) \frac{\log_3(5x+1)}{\log_3(7x-1)^2} \leq 1$$

a) cette équation est définie ssi : $5x+1 > 0$ et

$$\log_3(7x-1)^2 \neq 0 \text{ et } 7x-1 \neq 0$$

cad : $x > -\frac{1}{5}$ et $x \neq \frac{1}{7}$ et $x \neq \frac{2}{7}$ et $x \neq 0$

$$D_E =]-\frac{1}{5}; +\infty[- \left\{ 0; \frac{1}{7}; \frac{2}{7} \right\}$$

D'abord étudions le signe de : $\log_3(7x-1)^2$

$$\log_3(7x-1)^2 \geq 0 \Leftrightarrow (7x-1)^2 \geq 1 \text{ car : } \log_{\frac{1}{2}}$$

strictement décroissante

$$\Leftrightarrow (7x-1)^2 - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x(7x-2) \geq 0$$

1 cas : si : $x \in]-\frac{1}{5}; 0[\cup]\frac{2}{7}; +\infty[$ on a donc :

$$\log_3(7x-1)^2 \geq 0$$

$$\frac{\log_3(5x+1)}{\log_3(7x-1)^2} \leq 1 \Leftrightarrow \log_3(5x+1) \leq \log_3(7x-1)^2$$

$$\Leftrightarrow 5x+1 \leq (7x-1)^2 \Leftrightarrow 0 \leq 49x^2 - 19x$$

$$\Leftrightarrow x \in]-\frac{1}{5}; 0[\cup]\frac{19}{49}; +\infty[$$

2 cas : si : $x \in]0; \frac{1}{7}[\cup]\frac{1}{7}; \frac{2}{7}[$ on a donc :

$$\log_3(7x-1)^2 < 0$$

$$\frac{\log_3(5x+1)}{\log_3(7x-1)^2} \leq 1 \Leftrightarrow \log_3(7x-1)^2 \leq \log_3(5x+1)$$

$$\Leftrightarrow (7x-1)^2 \leq 5x+1 \Leftrightarrow 49x^2 - 19x \leq 0$$

$$\Leftrightarrow x \in \left(]0; \frac{1}{7}[\cup]\frac{1}{7}; \frac{2}{7}[\right) \cap \left[0; \frac{19}{49} \right] \Leftrightarrow x \in]0; \frac{1}{7}[\cup]\frac{1}{7}; \frac{2}{7}[$$

$$\text{Donc : } S =]-\frac{1}{5}; 0[\cup]0; \frac{1}{7}[\cup]\frac{1}{7}; \frac{2}{7}[\cup]\frac{19}{49}; +\infty[$$

Exercice 22 :A) soit la fonction g définie

$$\text{par : } g(x) = x - \ln x$$

1) Déterminer D_g l'ensemble de définition de la fonction g et déterminer les limites aux bornes de D_g

2) Déterminer la fonction dérivée de la fonction g puis dresser le tableau de variation de g

3) en déduire que : $\forall x > 0 \quad x > \ln x$

B) soit la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x + \ln x}{x - \ln x}; \text{ si } x > 0 \\ f(0) = -1 \end{cases}$$

1) Montrer que $D_f =]0; +\infty[$

2) Montrer que f est continue à droite de 0

3) calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

4) Etudier la dérivabilité de la fonction f à droite de 0

5) Montrer que : $\forall x \in]0; +\infty[\quad f'(x) = \frac{2(1 - \ln x)}{(x - \ln x)^2}$

6) Dresser le tableau de variation de f

7) déterminer les points d'intersections de C_f et la

Droite : $(\Delta) : y = 1$

8) Montrer que : C_f coupe l'axe des abscisses

en un point d'abscisse dans $]\frac{1}{2}; 1[$

9) Construire la courbe C_f dans un repère

$(O; \vec{i}; \vec{j})$ ($\ln 2 \approx 0,7$, $e \approx 2,7$)

Solution :1) $D_g =]0; +\infty[$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \ln x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = +\infty$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x - \ln x = +\infty \quad \text{Car : } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$2) \quad g'(x) = (x - \ln x)' = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$$

Le signe de: $g'(x)$ est celui de $x-1$ car $x \in]0; +\infty[$

Tableau de variation de g

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
$f(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$

3) on remarque que : que la fonction g

Admet une valeur minimal en $x_0 = 1$

Donc : $g(1) \leq g(x) \quad \forall x \in]0; +\infty[\quad g(1) = 1$

Donc : $0 < 1 \leq x - \ln x$ Donc : $\ln x < x \quad \forall x \in]0; +\infty[$

$$B) 1) \begin{cases} f(x) = \frac{x + \ln x}{x - \ln x} \\ f(0) = -1 \end{cases}$$

f est définie ssi $x - \ln x \neq 0$ et $x > 0$

On a $0 < x - \ln x$ donc : $x - \ln x \neq 0$ et on a $f(0) = -1$

Donc : $D_f =]0; +\infty[$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + \ln x}{x - \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x \left(\frac{x}{\ln x} + 1 \right)}{\ln x \left(\frac{x}{\ln x} - 1 \right)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x}{\ln x} + 1}{\frac{x}{\ln x} - 1}$$

Et on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\ln x} = 0^-$ et $\frac{0}{\infty} = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1 = f(0)$$

Donc : f est continue à droite de 0

3)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \ln x}{x - \ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(1 + \frac{\ln x}{x} \right)}{x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{\ln x}{x}}{1 - \frac{\ln x}{x}} = 1$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

Interprétation graphique : la droite $y = 1$ est une

asymptote à la courbe de f

4) Etude de la dérivabilité de la fonction f à droite de 0 :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x + \ln x}{x - \ln x} + 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + \ln x + x - \ln x}{x(x - \ln x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{x(x - \ln x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x - \ln x} = 0 = f'_d(0)$$

Donc : f est dérivable à droite de 0

5)

$$f'(x) = \left(\frac{x + \ln x}{x - \ln x} \right)' = \frac{(x + \ln x)'(x - \ln x) - (x + \ln x)(x - \ln x)'}{(x - \ln x)^2}$$

$$= \frac{\left(1 + \frac{1}{x} \right)(x - \ln x) - (x + \ln x) \left(1 - \frac{1}{x} \right)}{(x - \ln x)^2} = \frac{x - \ln x + 1 - \frac{\ln x}{x} - x + \ln x + 1 + \frac{\ln x}{x}}{(x - \ln x)^2}$$

$$\forall x \in]0; +\infty[: f'(x) = \frac{2 - 2\ln x}{(x - \ln x)^2} = \frac{2(1 - \ln x)}{(x - \ln x)^2}$$

6) tableau de variation de $f : x \in]0; +\infty[$

Le signe de: $f'(x)$ est celui de $1 - \ln x$

$$1 - \ln x > 0 \Leftrightarrow 1 > \ln x \Leftrightarrow \ln e > \ln x \Leftrightarrow e > x$$

Tableau de variation de f

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		$\frac{e+1}{e-1}$	

7) points d'intersections de C_f et $(\Delta) : y = 1$?

$$f(x) = 1 \Leftrightarrow \frac{x + \ln x}{x - \ln x} = 1 \Leftrightarrow x + \ln x = x - \ln x$$

$$f(x) = 1 \Leftrightarrow 2\ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

le point d'intersection de C_f et la Droite : $(\Delta) : y = 1$

est : $A(1; 1)$

8) f est continue sur $D_f =]0; +\infty[$ donc continue

$$\text{Sur : } \left[\frac{1}{2}; 1 \right] \text{ et on a : } f(1) = \frac{\frac{1}{2} + \ln(1)}{\frac{1}{2} - \ln(1)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1 > 0$$

$$\text{Et } f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2} + \ln\left(\frac{1}{2}\right)}{\frac{1}{2} - \ln\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{1}{2} - \ln 2}{\frac{1}{2} + \ln 2} = \frac{1 - 2\ln 2}{1 + 2\ln 2} < 0$$

Donc : d'après le théorème des valeurs


intermédiaires : l'équation $f(x) = 0$ admet au

moins une solution dans $\left] \frac{1}{2}; 1 \right[$ cad C_f coupe

l'axe des abscisses en un point d'abscisse

dans $\left] \frac{1}{2}; 1 \right[$

9)



Exercice 23 : Considérons les fonctions f et g définies sur $]-1; +\infty[$ par :

$$f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} \text{ et } g(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}$$

1)a) calculer les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) ; \lim_{x \rightarrow -1^+} g(x)$$

b) montrer que : $\forall x \in]-1; +\infty[$ on a :

$$g(x) = (1+x) \left(\frac{\ln(1+x)}{1+x} - \frac{2x^3 - 3x^2 + 6x}{6(1+x)} \right)$$

et en déduire : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

c) Etudier les variations des fonctions f et g .
Puis dresser les tableaux de variations de f et g

2) en déduire que $\forall x \in]0; +\infty[$:

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$$

3) calculer : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$

4) montrer que : $\forall x \in]0; +\infty[$:

$$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$$

Solution : 1) $\lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(1+x)$?

On pose : $t = 1+x \quad x \rightarrow -1^+ \Leftrightarrow t \rightarrow 0^+$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(1+x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \ln t = -\infty$$

$$\text{Et on a : } \lim_{x \rightarrow -1^+} -x + \frac{x^2}{2} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) ? \quad \text{on a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} -x + \frac{x^2}{2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2} = +\infty$$

$$\text{Et on a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+x) = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = ? \quad \text{on a : } \lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(1+x) = -\infty$$

$$\text{Et } \lim_{x \rightarrow -1^+} -x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} = \frac{11}{6} \text{ donc : } \lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = -\infty$$

b) montrons que : $\forall x \in]-1; +\infty[$ on a :

$$g(x) = (1+x) \left(\frac{\ln(1+x)}{1+x} - \frac{2x^3 - 3x^2 + 6x}{6(1+x)} \right) ?$$

$$g(x) = \ln(1+x) - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right) = \ln(1+x) - \left(\frac{2x^3 - 3x^2 + 6x}{6} \right)$$

$$g(x) = (1+x) \left(\frac{\ln(1+x)}{1+x} - \frac{2x^3 - 3x^2 + 6x}{6(1+x)} \right)$$

Déduction de : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$?

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x) \left(\frac{\ln(1+x)}{1+x} - \frac{2x^3 - 3x^2 + 6x}{6(1+x)} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x} ? \text{ On pose: } t = 1+x$$

$x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow t \rightarrow +\infty$ donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 3x^2 + 6x}{6(1+x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3}{6x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{3} = +\infty$$

Donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1+x = +\infty$

C1) Etude des variations les fonctions f ?

$\forall x \in]-1; +\infty[$ $x \rightarrow \ln(1+x)$ est dérivable donc f est

dérivable et on a :

$$f'(x) = \frac{(1+x)'}{1+x} - 1+x = \frac{1}{1+x} - (1-x) = \frac{x^2}{1+x} \geq 0 \quad \forall x \in]-1; +\infty[$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Donc : *tableau de variations de f* :

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+
$f(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

C2) Etude des variations les fonctions g ?

g est dérivable sur $\forall x \in]-1; +\infty[$ et on a :

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - (1-x+x^2) = \frac{-x^3}{1+x}$$

Le signe de $g'(x)$ est celui de $-x$

Donc : *tableau de variations de g* :

x	-1	0	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	$-\infty$	0	$-\infty$

2) déduction d'un encadrement de $\ln(1+x)$?

Des variations les fonctions f et g en déduit que :

$g(x) < 0 < f(x) \quad \forall x \in]0; +\infty[$ donc :

$$\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} < 0 < \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$$

$$\text{Donc : } x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \quad \forall x \in]0; +\infty[$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} ?$$

$$\text{Donc : } x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \quad \text{on déduit que}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{x}{3} < \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} < \frac{1}{2} \quad \text{et puisque : } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} - \frac{x}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

4) montrons que : $\forall x \in]0; +\infty[$:

$$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} ?$$

Soit ψ la fonction définie $\forall x \in]-1; +\infty[$

$$\text{Par : } \psi(x) = g(x) + \frac{x^4}{4}$$

ψ est dérivable sur $\forall x \in]-1; +\infty[$ et on a :

$$\psi'(x) = g'(x) + x^3 = \frac{x^4}{1+x} \geq 0 \quad \forall x \in]-1; +\infty[$$

$\psi'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ donc ψ strictement croissante

sur $]-1; +\infty[$

$$x \geq 0 \Rightarrow \psi(x) \geq \psi(0) = 0$$

$$\text{donc : } x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} < \ln(1+x) \quad \forall x \in]0; +\infty[$$

$$\text{donc : } x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$$

Exercice 24 : Considérons la fonction f définie

$$\text{par : } f(x) = x - 3 + \frac{3}{2x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right|$$

1) Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f

2) montrer que le domaine d'étude de f est :

$$D_E =]0; 1[\cup]1; +\infty[$$

3) Déterminer les limites aux bornes de D_E

4) Etudier les variations de f sur D_E

5) Etudier les branches infinies de (C_f)

la courbe de f

6). Construire la courbe (C_f) dans D_E

Solution : 1) $f(x) = x - 3 + \frac{3}{2x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right|$

cette fonction est définie ssi : $x \neq 0$ et $x \neq 1$

et $\frac{x+1}{x-1} \neq 0$ donc : $x \neq -1$ et $x \neq 1$ et $x \neq 0$

donc : $D_f = \mathbb{R} - \{-1; 0; 1\}$

2) le domaine d'étude de f ?

a) $\forall x \in \mathbb{R} - \{-1; 0; 1\}$ on a $-x \in \mathbb{R} - \{-1; 0; 1\}$

b) $f(-x) = -x - 3 - \frac{3}{2x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{-x+1}{-x-1} \right|$

$f(-x) = -x - 3 - \frac{3}{2x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|$

$f(-x) = -x - 3 - \frac{3}{2x} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right|$

Donc : $f(-x) + f(x) = -6$

Donc : $f(2 \times 0 - x) + f(x) = 2 \times (-3) - f(x)$

Donc le point : $I(0; -3)$ est un centre de symétrie

de (C_f) la courbe de f

donc Il suffit d'étudier f sur : $D_E =]0; 1[\cup]1; +\infty[$

3) les limites aux bornes de D_E ?

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$

On a : $\lim_{x \rightarrow 1} \left| \frac{x+1}{x-1} \right| = +\infty$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} \ln t = +\infty$

donc : $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$

on a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| = 0$ donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

4) Etude des variations de f sur D_E ?

La fonction f est dérivable sur les intervalles $]1; +\infty[$ et $]0; 1[$ (somme et composées de fonctions dérivables)

et on a : $f'(x) = 1 - \frac{3}{2x^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} \right) = \frac{(2x^2-1)(x^2-3)}{2x^2(x^2-1)}$

$\forall x \in]0; 1[\cup]1; +\infty[$

Donc : *tableau de variations de f* :

x	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$+\infty$	\searrow	$f(\frac{\sqrt{2}}{2})$	\nearrow	$+\infty$
			$+\infty$	\searrow	$f(\sqrt{3})$
				\nearrow	$+\infty$

5) Etude des branches infinies de (C_f)

la courbe de f ?

• $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ donc : $x=0$ est une asymptote

de la courbe de f

• $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$ donc : $x=1$ est une asymptote


de la courbe de f

• $x=-1$ est une asymptote de la courbe de f (par symétrie)

• On a : $f(x) - (x-3) = \frac{3}{2x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right|$

$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) - (x-3) = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{3}{2x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| = 0$

Donc : $y = x - 3$ est une asymptote oblique de la courbe de f au voisinage de $+\infty$ et $-\infty$



4. Déterminer la fonction dérivée de la fonction g puis dresser le tableau de variation de g
5. Etudier les branches infinies de la courbe Cg .
6. Construire la courbe Cg

« C'est en forgeant que l'on devient forgeron »
Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et
exercices Que l'on devient un mathématicien



Exercice 25 : 1) Résoudre dans \mathbb{R} l'équation :

$$\log_x (x + 1) = \log_{x+1} (x)$$

2) Résoudre dans \mathbb{R} l'inéquation :

$$\log_2 (x) > \log_x (2)$$

Exercice 26 : Considérons la fonction f définie

$$\text{par : } f(x) = \sqrt{1 - \ln x}$$

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f
- 2) Résoudre l'équation $f(x) = 1$
- 3) Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 1$
- 4) Etudier la dérivabilité de la fonction f à gauche de e
- 5) Etudier les variations de f et en déduire que f est une bijection de D_f vers un intervalle J .
- 6) Construire dans le même repère Cf et $C_{f^{-1}}$

Exercice 27 : Considérons la fonction g définie

$$\text{par : } g(x) = x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction g
2. a) Montrer que la fonction g admet un prolongement par continuité en 0 noté g
- b) Etudier la dérivabilité de g en 0 et interpréter géométriquement le résultat obtenu.
3. Déterminer les limites de la fonction g en $+\infty$ et en -1 à gauche.